

Pasningsvejledning for Båndet tigersalamander



Foto: Kurt Jensen.

Videnskabeligt navn: *Ambystoma mavortium* (blev tidligere anset for en underart af østlig tigersalamander (*Ambystoma tigrinum*)).

Dansk navn: Båndet tigersalamander, tigersalamander.

Udseende: En meget stor og kraftig salamander med en længde på 20-35 cm. Hovedet er aflangt og en smule affladet med en rund snude. Øjnene er små og udstående. Kroppen er kompakt og robust med rækker af tydelige furer på hver side. Huden er glat. Halen er kraftig, noget sammentrykket fra siderne og lige så lang eller lidt kortere kroppen. Oversiden er mørkebrun til sort med lysegule til olivengrønne tværbånd og pletter. Undersiden er lysegrå med lysere pletter.

I yngletiden kan hannen let kendes fra hunnen på en kraftigt omsvulmet kloak og en højere hale.

Uden for yngletiden kan hannen kendes på sin hvælvede kloak og længere hale.

Båndet tigersalamander ligner østlig tigersalamander (*Ambystoma tigrinum*) til forveksling, og i visse tilfælde kan de to arter være meget vanskelige at skelne fra hinanden. Østlig tigersalamander er dog normalt plettet, mens båndet tiger-salamander har brede tværbånd. Plettet salamander (*Ambystoma maculatum*) ligner også, men det er en mindre art, hvis gule til orange pletter er arrangeret i to rækker ned langs ryggen.

Udbredelse i naturen: Det centrale og sydlige USA og det nordligste Mexico.

Biologi: Båndet tigersalamander er en landsalamander, som lever en meget skjult tilværelse. Den findes på en række forskellige levesteder – fra fugtige skovområder over kulturland til halvørkener og ørkener. Vigtigst for arter er, at der er vand-huller og søer, hvori den kan yngle.

Hold i terrarium: Båndede tigersalamandre holdes bedst i store, fugtige og kølige terrarier. Til et par vil et bundareal på 80 x 40 cm være passende. Vil man holde flere tigersalamandre sammen, skal terrariet være tilsvarende større. Terrariet indrettes som en skovbund. Bundlaget skal nederst bestå af et drænlag af leca eller groft grus. Derpå kommer et tykt lag af sphagnum, som øverst dækkes af mos. Mosset udskiftes efterhånden, som det visner. Oven på mosset lægges store korkstykker, træødder og lignende, som salamandrene kan bruge som skjul. Tigersalamandrene vil dog også grave gange i bund-laget. Terrariet kan f.eks. beplantes med vedbend, guldranke og andre kraftige planter. Planterne kan man med fordel lade blive i deres potter, da tigersalamandrene ellers hurtigt vil grave dem op. En stor, lavvandet vandskål fuldender indretningen. Temperaturen bør ligge på 20-24°C om sommeren og 5-10°C om vinteren. Årstidsforskellen er med til at få tiger-salamandrene i ynglestemning og vil gavne deres generelle velbefindende.

Tigersalamandre er ret tolerante over for høje temperaturer, men de tåler ikke temperaturer over 28-30 °C i længere perioder.

Hvis terrariet står lyst (dog aldrig i direkte sol!), er det ikke nødvendig med kunstig belysning. Hvis man ønsker en ordentlig plantevækst, må det dog anbefales, at belyse terrariet 8-14 timer dagligt med lysstofrør eller elsparepærer.

Foder: Tigersalamandre er grådige og lette at fodre. Som udgangspunkt æder de dog udelukkende levende foder. Regnorm, nøgensnegle og forskellige, ikke for hurtige insekter, er udmærkede foderemner. De vil endda æde museunger, hvis de får dem tilbudt. Tigersalamandrene aflægger hurtigt deres skyhed og lader sig fodre fra hånden eller fra pincet. På grund af tigersalamandrenes grådighed, bliver de let for fede, og man bør så vidt muligt undgå at overfodre dem. Voksne dyr skal normalt fodres hver anden til tredje dag unger lidt oftere.

Hold med andre dyr: Tigersalamandre er fredelige over for hinanden, og så længe terrariet er stort nok, kan man sagtens holde flere eksemplarer sammen. På grund af deres størrelse og grådighed bør man dog ikke holde tigersalamandrene sammen med andre arter. Andre padde vil de som regel betragte som føde.

Adfærd: Tigersalamanderen er strengt nataktiv, og tilbringer dagen under sten og væltede træstammer og i musehuller og selv gravede gange under jorden. Den lever underjordisk det meste af året og kommer kun op til overfladen i fugtige regnfulde perioder.

Yngletiden ligger normalt fra september til maj, men båndet tigersalamander lader til at kunne yngle året rundt. Tiger-salamandrene parrer sig og lægger æg i vandhuller og småsøer. Larverne bliver meget store, og det er ikke ualmindeligt, at de bliver kønsmodne som larver – et fænomen, som kaldes neoteni.

Giftighed: Hvis tigersalamandre bliver generede, kan de afsondre en mælkehvid gift på oversiden af kroppen, særligt fra halen. Giften er ildesmagende, men er ikke farlig for mennesker. Alligevel bør man nok vaske hænder, når man har haft tiger-salamanderen oppe i hænderne.

Levealder: I fangenskab kan tigersalamandre blive op til 16 år gamle – i visse tilfælde måske endda ældre.

Sygdomstegn: Sunde tigersalamandre har en blank, skinnende hud, klare øjne og runde maver. Åbne sår og en mat hud er tegn på sygdom. Tigersalamandre må ikke virke dvasket, og bør være opmærksomme og gerne kravle væk, hvis de berøres.

Lovgivning: Den båndede tigersalamander er ikke fredet. Den er heller ikke beskyttet af Washingtonkonventionen (CITES).

Frøgruppen
www.nhf.dk/dartfrog

Denne pasningsvejledning er for hold af padde som hobbydyr. Disse padde kan også holdes forsvarligt på ander måde end beskrevet i denne vejledning.

Ver. 1 2008/9Tomas Bille.